



Escanografía de abdomen total

Pélvica

Sigue cuidadosamente las siguientes instrucciones y recuerda que el éxito del examen depende de tu colaboración.

NOTA IMPORTANTE:

Infórmanos si en la última semana te han realizado colon por enema, tránsito intestinal o serie gastroduodenal.

Requiere examen de creatinina

(Esto lo define la auxiliar de enfermería en el momento que realices la entrevista clínica).

RECOMENDACIONES:

- **El examen requiere cuatro (4) horas de ayuno.**
- 12 horas antes del examen debes diluir un frasco de gastroview solución oral de 30 cc en un litro de agua (4 vasos grandes) o de jugo preparado en agua, esta mezcla debes tomarla en el transcurso de una hora. Ten en cuenta que este medicamento puede generar cólico abdominal o diarrea.
- Si en la orden médica se especifica triple contraste, en la Unidad de Imágenes Diagnósticas se te administrará un enema rectal con medio de contraste, lo cual puede generar un leve sangrado debido a que esta zona es muy vascularizada, sin embargo no es común que suceda.
- Si tu examen es en horas de la tarde, debes realizar la preparación ya indicada, seis (6) horas antes.
- Para la aplicación del medio de contraste endovenoso se canaliza una vena que debe ser de buen calibre (preferiblemente en pliegue) para así garantizar la aplicación segura del contraste.
- Es importante que te hidrates muy bien antes y después del procedimiento.
- Debes traer estudios anteriores (rayos X, resonancias, ecografías, etc). Relacionados con el abdomen.
- Debes llegar una hora antes del examen para iniciar la preparación con medio de contraste oral.
- Debes presentar orden médica y autorizaciones de la entidad que te remite.

NOTA: el frasco de GASTROVIEW SOLUCIÓN ORAL DE 30 cc se puede adquirir en la Unidad de Imágenes Diagnósticas.

Si no puedes cumplir con la cita o deseas cambiarla, debes informar con anticipación.