


Lo que debes saber acerca del catéter PICC

Programa Catéter
Venoso Seguro

WILLADO Superstuid
www.willado.com

Clínica **Imbanaco**
Vocación de Servicio

¿Qué es PICC?




La sigla PICC, en inglés Peripherally Inserted Central Venous Catheter (Catéter Venoso Central de Inserción Periférica) se trata de un acceso venoso insertado desde una vena de los brazos hasta una vena de gran calibre llamada vena cava superior.

¿Quién inserta el catéter?

En la **Clínica Imbanaco** contamos con un equipo de profesionales especializado y certificado para este tipo de procedimiento.

Signos de alarma

Si presentas algunos de los siguientes signos y síntomas, informa inmediatamente al equipo de Catéter Venoso Seguro.



1. Dolor, limitación del movimiento, inflamación del brazo.
2. Salida del catéter.
3. Salida de líquido durante la administración de medicamentos.
4. Sangrado, enrojecimiento, salida de secreción del sitio de inserción.
5. Desprendimiento de la película transparente.

¿Quién retira el catéter?


Lo retira el personal de la **Clínica Imbanaco**, bajo orden médica.

¿Qué sucede durante la colocación del catéter?




Normalmente se pone anestesia local antes de canalizar la vena en la cara interna del brazo. La punción de la vena se hace por medio de un ecógrafo, el cual garantiza la canalización de la vena con éxito.

Beneficios del catéter



El catéter PICC sirve para administrar todos los tipos de medicamentos dentro de la vena, también sirve para la recolección de muestras sanguíneas y administración de componentes de la sangre.

Riesgos del catéter



- Riesgo de infección que puede producirse por la inadecuada manipulación o por humedad, facilitando el ingreso de bacterias a la sangre.
- Riesgo de trombosis venosa profunda, ocurre con la formación de un coágulo de sangre en la vena del brazo donde se encuentra el catéter.

• Riesgo de oclusión del catéter, este se previene lavando con solución salina y una jeringa de 10 cm el catéter antes y después de la toma de muestras sanguíneas y de la administración de medicamentos. Si se llega a taponar, debe ser informado al grupo de Catéter Seguro, ellos lo revisarán y en caso de no poder destaparlo, este deberá cambiarse si aún lo requiere.

Cuidados domiciliarios del catéter



Al salir de la clínica para tu casa, con el catéter puesto, recuerda mantenerlo limpio, seco y el apósito transparente en óptimas condiciones. Así mismo, ten presente la fecha de la próxima curación.



Antes de cualquier procedimiento, el personal de salud encargado de manipular el catéter, siempre debe realizar lavado de manos con agua y jabón, como también higiene permanente con alcohol glicerinado.



La curación y administración de medicamentos debe ser realizada por el personal de enfermería entrenado en el Hospital en Casa, que va a continuar el tratamiento en tu hogar.



Si te administran medicamentos a través del catéter, el profesional debe desinfectar la válvula con alcohol antes de administrar cualquier líquido.



Lavar antes y después de administrar el medicamento con una jeringa de 10 ml. con solución salina para prevenir que el catéter se tape.



Cuando te vayas a duchar debes cubrir el brazo donde tienes el catéter con papel transparente, no metas el brazo al chorro del agua para evitar la filtración de agua.



Los baños en piscinas o mar están restringidos.




No permitas que te tomen la presión arterial en el brazo donde tienes el catéter.

Curación del catéter



Durante tu hospitalización se realizará seguimiento continuo por parte del grupo de Catéter Seguro. Así mismo, el personal de enfermería de la **Clínica Imbanaco** está entrenado para la manipulación del mismo.



El grupo cuenta con una agenda para la asignación de citas para la curación del catéter.



Si recibes quimioterapia ambulatoria, serás contactado un día antes por nuestro grupo para confirmar la cita con horario, después de confirmada, debes llegar puntual y en lo posible asistir con un acompañante.



La curación debe realizarse en la fecha asignada por el grupo profesional de PICC. Contamos con diversos apósitos que varían los días de curación.



Si el apósito se encuentra desprendido, mojado o con presencia de sangre, el profesional de la salud realizará la curación en una fecha diferente a la asignada.



La curación solo la debe realizar un profesional entrenado para el procedimiento.



La curación del catéter es independiente de cualquier otro procedimiento que puedas tener.



Procura permanecer con el vendaje que cubre el catéter limpio y seco.



Evita lastimarte con las uñas en el momento de sentir comezón alrededor del apósito.

FECHA DE IMPLANTACIÓN

CENTÍMETROS IMPLANTADOS

CENTÍMETROS EXTERNOS

UBICACIÓN

PROFESIONAL

LOTE

Sede Principal

- Horario de atención telefónica:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Horario de atención curación de catéter:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- Dirección: Cra. 38 Bis # 5B2-04 Piso 3.
- Celular: 318 656 6303.
- Cali, Colombia.

Encuentre esta información en:
www.imbanaco.com

Clínica Imbanaco



Vocación de Servicio