



Sigue cuidadosamente las siguientes instrucciones y recuerda que el éxito del examen depende de tu colaboración.

RECOMENDACIONES:

1. Si estás tomando alguno de los siguientes anticoagulantes como **warfarina, heparina, coumadin, clopidogrel, persantin, liquemine, ecotrin, plavix, clexane, iscover, fraxiparine, aspirina, cardioaspirina, ticagrelor, brilinta, prasugrel, efient, xarelto, apixaban, eliquis, edoxaban, rivaroxaban, clenox**; por favor consulta con tu médico tratante el manejo que se le dará a tu terapia de coagulación, **debes informarla al servicio de Imágenes Diagnósticas para programar el procedimiento.**
2. Cinco (5) días antes del procedimiento no debes ingerir medicamentos antiinflamatorios como motriz, advil, feldene, ibuprofeno, diclofenaco, ponstan, naproxeno, voltaren, indocid.
3. Se deben presentar estudios anteriores previos a la programación del procedimiento.
4. Un día antes del procedimiento presentar resultado de tiempos de coagulación no superior a 10 días.

DÍA DEL EXAMEN:

- Debes suspender la ingesta de alimentos o líquidos cuatro (4) horas antes del examen.
- Debes llegar **40 minutos antes** de la cita.
- Debes venir acompañado de una persona adulta.
- Debes presentar orden médica y autorizaciones de la entidad que te remite

NOTA: Después del procedimiento el paciente debe permanecer en reposo por dos (2) horas en la Unidad de Imágenes Diagnósticas.

Tu cita es el día: _____ **a las:** _____

Si no puedes cumplir con la cita o deseas cambiarla, debes informar con anticipación.