

Cultivo de Mycobacterias en orina



Recomendaciones

- Efectúe aseo genital completo con abundante agua antes de recolectar la muestra.
- Recolectar la primera micción de la mañana de la siguiente manera: descartar la primera parte de la micción, para esto debe orinar directamente en el inodoro por uno o dos segundos, y luego empezar a recoger la orina en su totalidad en un recipiente con capacidad de 50 ml.
- Entregar la muestra lo más pronto en el laboratorio.
- Realizar el mismo procedimiento durante tres días consecutivos.



Esta muestra puede ser tomada en cualquiera de nuestros centros diagnósticos.



Ministerio de Salud
Antioquia y el Estado
de Antioquia



Instituto Nacional de
Ciencias de la Salud
Ministerio de Salud
Antioquia y el Estado
de Antioquia



Accreditado por el
LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO
de Patología Inmunológica



Facultad de Ciencias de la Salud
LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO
de Patología Inmunológica



Facultad de Ciencias de la Salud
LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO
de Patología Inmunológica



Facultad de Ciencias de la Salud
LABORATORIO CLÍNICO Y LABORATORIO
de Patología Inmunológica